





Epidémiologie des infections liées aux cathéters intravasculaires

Données SPIADI 2026 et évolutions 2020-2026.

Nathalie van der Mee-Marquet pour l'équipe SPIADI

Jeudi 24 septembre 2026, Journée régionale du CPIAS Bourgogne Franche Comté




3 bactériémies associées aux soins sur 10 sont liées à un cathéter intravasculaire (BLC).

Cathéters veineux centraux


CVC

Entrée dans la veine
Point de sortie
Cathéter




PICC

Extrémité distale du cathéter
Point d'insertion du PICC




CCI

Cathéter
Site de ponction
Chambre placée sous la peau



PICC PORT


Cathéter
Chambre placée sous la peau



Cathéters veineux périphériques


MID PI

Extrémité du cathéter
Midline avec prolongateur intégré




MID

Extrémité du cathéter
Midline sans prolongateur intégré




CVP court

Veine
Cathéter




Les cathéters veineux se distribuent dans 2 groupes.





8 BLC sur 10 sont liées à un cathéter veineux central.

Cohorte 350 sites




Progression de la part des BLC (PICC) et BLC (midline) (2020-2026; $p < 0,001$).






Les BLC sont principalement acquises en hospitalisation complète dans les établissements de santé; 11 % sont acquises au décours de soins prodigués en ville ou à domicile. Pas d'évolution depuis 2020.




Les BLC acquises en ville, à domicile et en EHPAD impliquent principalement PICC et CCI.
Les BLC (midline) sont plus souvent acquises dans les ES ($p = 0,004$).

Incidence des Bactériémies liées à un cathéter veineux central / 1000 JH (CVC, CCI, PICC, cathéter de dialyse) acquises dans le service

2026






Les BLC (CVC, CCI, PICC, cathéter de dialyse) sont principalement acquises dans les services de réanimation et d'onco.hématologie. Les taux d'incidence sont dans la cible nationale pour 7 services sur 10.



Les BLC (midline, CVP court) sont acquises dans tous les services.
Les taux d'incidence sont dans la cible nationale pour 8 services sur 10.




Cohorte 350 sites

CHIRURGIE BLC (midline) / 1000 JH (cohorte 2020-2026)




MEDECINE BLC (midline) / 1000 JH (cohorte 2020-2026)

% des services dans la cible




**Progression de l'incidences des BLC (midline)
acquises dans les services de médecine ($p < 0,001$) et de chirurgie ($p = 0,001$).**




Les BLC impliquent dans plus d'1 cas sur 2 des bactéries de la flore cutanée.
Les BLC (midline) sont plus souvent associées à une levure ($p = 0,0016$).


BLC (CVC)




BLC (CCI)




BLC (PICC)



BLC (midline)




BLC (CVP court)



Le délai de survenue des BLC

(délai entre la pose du cathéter et la survenue des premiers signes infectieux) varie selon les dispositifs.



Epidémiologie des infections liées aux cathéters intravasculaires

Merci à vous !

Contact@spiadi.fr