



Épisode 2 :
LE PORT DE GANTS
Les apports théoriques

Introduction




Quel est le point commun à tous ces
GANTS ?

✓ Ce sont des **EPI**
(équipement de protection
individuel) :
ils **protègent** celui qui les
porte

Gants & transmission croisée

« Je mets des gants pour prendre en charge les patients dès qu'il y a une suspicion d'infection, c'est plus rassurant pour mes patients et pour moi. **Ai-je raison ?** ».



Agnès- IDE
34 ans

ATTENTION

Le port de gants augmente le risque de transmission croisée

car il est généralement associé à une moindre compliance à l'hygiène des mains.

Picheansanthian W, Chotibang J. Glove utilization in the prevention of cross transmission: a systematic review. JBI Database System Rev Implement Rep. 2015 May 15;13(4):188-230. doi: 10.11124/jbisrir-2015-1817. PMID: 26447080.

Il est donc contre-productif de porter systématiquement des gants en cas de prise en charge d'un patient porteur de BMR ou autre situation infectieuse sauf gale et *Clostridium difficile* (= *Clostridioides difficile*).



Agnès- IDE
34 ans

Mais alors ils
me protègent
de quoi ? ».

Gants & risque AES

- **Barrière supplémentaire** entre les mains du personnel soignant et le sang ou les produits biologiques ou les muqueuses.
- **Réduction de l'inoculum viral** de 46 à 86 % par essuyage de l'aiguille : **principe d'essuyage.**



Mast S, Woolwine J, Gerberding J. Efficacy of gloves in reducing blood volumes transferred during simulated needlestick. J Infect Diseases 1993; 168: 1589-1592

Gants & lésions sur les mains des soignants

- Il est recommandé de porter des gants quand les mains du soignant comportent des lésions, même minimales comme une écorchure, une brûlure ou en cas de dermatose.
- La lésion peut être considérée comme une porte d'entrée aux micro-organismes.



Gants & risque chimique

- Risque majoré si expositions fréquentes
« **toxicité chronique** »
- Privilégier si possible :
 - Manchettes longues
 - Gants vinyle/ nitrile
 - Lunettes de protection & protection de la tenue

En cas d'utilisation de gants de ménage réutilisables, prévoir un entretien stricte des gants ou une dotation personnelle.

Risque de transmission croisée.



Les indications en situation de soins



Les gants sont indiqués en cas de :

- ✓ Risque **d'exposition au sang** ou des **liquides biologiques**
- ✓ Contact avec les **muqueuses** ou la **peau lésée** des patients
- ✓ **Lésions** sur les mains des soignants
- ✓ Exposition à des **produits chimiques**
- ✓ Prise en charge d'un patient avec des agents pathogènes particuliers : ***Sarcoptes scabiei*** (gale) et ***Clostridioides difficile***.

Gants & agents pathogènes particuliers : gale et CD

- Port de gants pour **tout contact avec le patient**, le linge, la literie et l'environnement du patient pour éviter de se contaminer les mains.
- FHA avant le port de gants
- Lavage simple des mains suivi d'une FHA sur mains correctement séchées après le port de gants



L'hygiène des mains AVANT et APRES

! Ne pas oublier l'hygiène des mains avant et après le port de gant !



Se servir en solution



Paume contre paume :



Paume contre dos de la main :



Doigts entrelacés :



Pouches :



Doigts contre paumes:



Ongles :



Poignets :



fin

Le port de gants




1. Prélever un gant de soins de son emballage d'origine.



2. Ne toucher qu'une surface limitée du gant correspondant au poignet (bord supérieur du gant).



3. Enfiler le premier gant.



4. Prélever un second gant avec la main non gantée et ne toucher qu'une surface limitée du second gant, correspondant au poignet.




5. Afin de ne pas toucher la peau de l'avant-bras avec la main gantée, retourner la surface externe du gant à enfiler sur les doigts repliés de la main gantée, permettant ainsi d'enfiler le gant sur la seconde main.




6. Une fois les gants enfilés, les mains ne touchent rien d'autre que ce qui est défini par les indications et les conditions d'usage des gants.


Le retrait de gants



1. Pincer un gant au niveau du poignet afin de le retirer sans toucher la peau de l'avant-bras, en le retournant sur la main, de façon à ce que la surface interne se retrouve à l'extérieur.



2. Tenir le gant retiré dans la main gantée et glisser les doigts de la main dégantée entre le gant et le poignet de l'autre main. Retourner le gant depuis l'intérieur sur la main de façon à ce que la surface interne se retrouve à l'extérieur, tout en enveloppant le gant déjà retiré.



3. **Jeter les gants usagés.**

Filières DAOM ou DASRI en cas de risque infectieux.

En synthèse

Les gants , il
faut savoir
quand les porter
et quand les
retirer !



Avez-vous des questions ?

Groupe de travail :

Céline Bouvier-Slekovec – CPias BFC

Edith Tissot – CPias BFC

Marie Bouhelier – EHPAD Franche-Montagne Maiche

Amélie Varin – EOH CHU Minjoz Besançon

Marion Bernard – étudiante

Imane El Fahfouhi – étudiante