

COVID19

Stratégie diagnostique

En vue d'une hospitalisation dans l'établissement : *via* les urgences
OU entrée directe : patient suspect COVID

En ES

Pneumopathie

OUI

NON

- Oxygénothérapie nécessaire
- **OU** FR > 22
- **OU** tirage
- **OU** présence de détresse respiratoire aiguë
- **OU** immunodépression

- Autre signe évocateur de COVID
(anosmie, troubles digestifs etc.)

NON

OUI

RT-PCR test rapide

Angioscanner thoracique

-

+

Aspect compatible COVID?

OUI

NON

Test antigénique

-

+

Début des symptômes < 7j?

- Confusion, agitation, ivresse
- **OU** Dément/déambulant
- **OU** Handicap mental
- **OU** Incapacité à garder un masque

OUI

NON

OUI

NON

Angioscanner thoracique

PCR test rapide

PCR test rapide

OUI

NON

Aspect compatible COVID?

NON

OUI

+

-

-

+

Hospitalisation secteur non COVID

Hospitalisation secteur COVID

Hospitalisation secteur non COVID

Hospitalisation secteur COVID

Hospit secteur non COVID

Hospitalisation secteur COVID

Maintien strict des mesures barrières entre le dépistage et le rendu du résultat

24/11/2020