



PREVENTION DU RISQUE LIÉ AU CORONAVIRUS

PORT DE MASQUE PAR LES PROFESSIONNELS

QUEL MASQUE, QUAND ET COMMENT ?

QUEL MASQUE ? Masque chirurgical EN 14683



QUAND ?

Masque chirurgical anti-projections réservé aux professionnels de santé


- En cas de contact avec un patient présentant des signes d'infection respiratoire (précautions complémentaires Gouttelettes)
- En cas de signes d'infection respiratoire chez lui (précautions standard)

Remarque : en période d'épidémie de coronavirus, tous les professionnels de santé portent un masque chirurgical (sauf indications de FFP2)

COMMENT ?

1. **Désinfection des mains avec la solution hydro-alcoolique** avant de prendre un masque dans la boîte (la face externe du masque = celle qui apparaît quand on ouvre la boîte)

2. **Positionner correctement** le masque =
- déplier le masque
 - poser le masque sur le visage
 - attacher les liens / mettre les élastiques derrière les oreilles
 - pincer la barrette nasale
- Le masque doit couvrir totalement le nez + bouche + menton



3. **Une fois positionné, ne plus le toucher**

4. **Le changer** dès qu'il est mouillé (éternuements, toux) ou *a minima* toutes les 4 heures

5. **Retirer le masque**, l'éliminer dans les déchets d'activité de soins puis réaliser une **désinfection des mains avec la solution hydro-alcoolique**





PREVENTION DU RISQUE LIÉ AU CORONAVIRUS

PORT DE MASQUE PAR LES PROFESSIONNELS

QUEL MASQUE, QUAND ET COMMENT ?

QUEL MASQUE ? **Masque FFP2 EN 149**



QUAND ?

Appareil de protection respiratoire exclusivement réservé aux professionnels de santé réalisant des gestes médicaux invasifs, ou des manœuvres, au niveau de la sphère respiratoire chez un patient Covid-19 (précautions complémentaires Gouttelettes Covid-19), par exemples :

- Intubation / extubation (dont masque laryngé)
- Oxygénothérapie à débit élevé
- Aspiration endotrachéale (hors système clos)
- Trachéotomie ou intervention sur trachéotomie
- Fibroscopie bronchique
- Kinésithérapie respiratoire générant des aérosols
- Aérosolthérapie
- Prélèvement nasopharyngé
- Explorations fonctionnelles respiratoires
- Actes de chirurgie dentaire avec usage d'instruments rotatifs à haute vitesse

Hors Covid-19 : Le port d'un appareil de protection respiratoire FFP2 reste indiqué pour les professionnels de santé prenant en charge des patients en précautions complémentaires Air : tuberculose, rougeole, varicelle.

COMMENT ?

1. **Désinfection des mains avec la solution hydro-alcoolique** avant de prendre un masque dans la boîte (la face externe du masque = celle qui apparaît quand on ouvre la boîte)

2. **Positionner correctement** le masque =

- déplier le masque
- poser le masque sur le visage
- mettre les élastiques : 1 base du cou et 1 derrière la tête
- pincer la barrette nasale

→ Le masque doit couvrir totalement le nez + bouche + menton



3. **Une fois positionné**, tester l'étanchéité du masque : inspirer et expirer bouche ouverte. Le masque doit se plaquer sur le visage à l'inspiration. Une fois ajusté, ne plus le toucher.

4. **Le changer** dès qu'il est mouillé (éternuements, toux) ou *a minima* toutes les 8 heures

5. **Retirer le masque**, l'éliminer dans les déchets d'activité de soins puis réaliser une **désinfection des mains avec la solution hydro-alcoolique**

