


Prévenir une exposition à des punaises de lit lors du transport sanitaire : les mesures qui permettent de minimiser le risque de propagation.

L'équipe soignante vous informe qu'un patient présente des lésions cutanées compatibles avec des piqûres de punaises de lit. On ne peut écarter que les effets personnels et le linge du patient soient infestés.

Réflexe n°1



Je refuse de prendre en charge le patient. J'ai peur que les punaises se propagent dans l'habitacle du véhicule et qu'en plus du véhicule, je sois exposé et que les patients suivants le soient également. Un autre transporteur le prendra sûrement en charge ou pas.



Ne pas prendre en charge le patient entraîne une perte de chance pour celui-ci si le recours aux soins n'est pas assuré.

Réflexe n°2



Je suis conscient que j'ai de la chance, on m'a prévenu ! L'information aurait pu ne pas m'être transmise !!
Maintenant que je sais, je suis vigilant et j'applique les mesures pour limiter le risque de propagation.

Ce qu'il faut faire en pratique :

1. Se frictionner les mains avec la SHA avant de prendre en charge le patient.
2. Placer les affaires du patient (sac à main, manteau, valise ...) dans un sac fermé hermétiquement, c'est-à-dire de façon à ce que rien ne puisse en sortir ou y entrer.
3. Faire porter une surblouse à manches longues à UU. Elle sera ôtée et éliminée dans un sac poubelle fermé à son arrivée dans le service d'accueil.
4. Protéger le véhicule :
 - a. Si le patient est autonome, la surblouse protège le véhicule.
 - b. Si le patient est en fauteuil roulant, ne pas charger dans le véhicule son fauteuil surtout si celui-ci est en tissu. Privilégier l'utilisation du fauteuil de l'ambulance (évite le risque de propagation des micro-organismes et facilite l'entretien des surfaces).
5. Informer les professionnels qui accueillent le patient du risque pressenti ou avéré.
6. Après avoir déposé le patient, réaliser l'entretien du véhicule :
 - a. s'équiper pour protéger sa tenue de travail : surblouse + paire de gants.
 - b. appliquer le protocole de nettoyage et de désinfection complète avant une nouvelle utilisation du véhicule :
 - i. aspirer le véhicule et jeter le sac de l'aspirateur dans un sac poubelle fermé hermétiquement après utilisation.
 - ii. idéalement, utiliser un nettoyeur vapeur. A défaut, passer une lingette UU imprégnée de détergent/désinfectant.
 - c. éliminer la surblouse, la paire de gants et la lingette dans un sac poubelle fermé.
 - d. réaliser une hygiène des mains : lavage simple au savon doux suivi d'une friction SHA.
 - e. reconditionner le véhicule.

Communiquer permet d'ajuster les modalités de prise en charge des patients dans une perspective de maîtrise du risque infectieux.