

## Oseltamivir

Cette étude n'impose aucune pratique de prescription d'oseltamivir. Le médecin reste souverain de son choix de prescription dans le cadre des recommandations nationales.

Aussi, la mise à disposition d'oseltamivir sera prise en charge selon les modalités habituelles au sein de l'établissement.

Dans son avis du 16 mars 2018, relatif à la prescription d'antiviraux en cas de grippe saisonnière, chez les patients à haut ou très haut risque, le Haut Conseil de la Santé Publique recommande une initiation du traitement antiviral le plus précocément possible sans attendre la confirmation virologique du cas ou du contact étroit.

Afin de faire le point sur la survenue d'effets indésirables (EI) liés à ce traitement, un suivi des déclarations sera assuré par les Centres régionaux de pharmacovigilance de Bourgogne et de Franche-Comté.

A ce jour, les cas signalés restent peu nombreux et relatent des EI essentiellement digestifs.



## Votre avis nous intéresse !

Que vous souhaitiez utiliser ou non des TROD-grippe ou le traitement antiviral, les pratiques de gestion de la grippe au sein de votre EHPAD nous aideront à identifier les mesures de gestion des épisodes de grippe les plus efficaces.

L'étude Gripp'Impact c'est **1 seul questionnaire** par épisode de grippe (quel que soit le nombre de cas).

## Comment participer ?

En téléchargeant le questionnaire sur site internet [www.cpiasbfc.fr](http://www.cpiasbfc.fr) et envoi par

**Mail** : [cpias-bfc@chu-besancon.fr](mailto:cpias-bfc@chu-besancon.fr)

ou

**Fax** : 03 81 66 85 58

## Financement :

Étude faisant l'objet d'un financement exclusif par le CPIas de Bourgogne Franche-Comté à hauteur de 4 000 €

Étude proposée en toute indépendance de l'industrie pharmaceutique.

Pour toutes **questions** sur l'étude, contacter le Dr C. Bouvier-Slekovec :  
[cslekovec@chu-besancon.fr](mailto:cslekovec@chu-besancon.fr)

# Flyer de présentation Gripp'Impact

Quelles sont les mesures les plus efficaces pour limiter l'impact des épidémies de grippe ?



Version du 25 octobre 2018

## Contexte

Au-delà de la désorganisation des soins qu'elles occasionnent, les épidémies de grippe ont des conséquences parfois dramatiques pour les résidents d'EHPAD qui, du fait de leur âge et de leurs comorbidités, sont particulièrement vulnérables.

Des mesures préventives ou visant à réduire l'ampleur des épidémies existent : vaccination antigrippale, mesures barrières, diagnostic rapide (TROD<sup>1</sup>), traitement antiviral.

L'impact individuel de chacune de ces mesures n'a, à ce jour, jamais été évalué.

**L'Objectif** de cette étude est donc d'évaluer l'impact des différentes mesures préventives et de gestion des cas dans la prise en charge des infections respiratoires aiguës en EHPAD.

Les résultats de l'étude Gripp'Impact permettront de définir les actions prioritaires à mettre en œuvre dans la gestion de situations d'épidémies de grippe.

<sup>1</sup>TROD : Test Rapide à Orientation Diagnostique

<sup>2</sup>EMHT : Équipe Mobile en Hygiène de Territoire

## Déroulé de l'étude

L'étude se déroulera entre **décembre 2018** et **mars 2019** et s'adresse à l'ensemble des **EHPAD de Bourgogne Franche-Comté** qu'ils aient ou non conventionné dans le cadre du dispositif d'appui. Les EHPAD participants seront répartis en 3 groupes (Cf. tableau ci-dessous).

Aucune donnée individuelle ne sera recueillie.

	Groupe 1	Groupe 2	Groupe 3
<b>CAT en cas de suspicion de grippe</b>			
Réalisation de TROD	Systématique	NON	Possible
Traitement curatif des cas et prophylactique des contacts à risque par oseltamivir	Selon recommandations si TROD +	selon recommandations si suspicion grippe	selon recommandations si suspicion grippe
Accompagnement pour la mise en place des mesures barrière	EMHT <sup>2</sup>	EMHT <sup>2</sup>	Ressource interne ou CPIas
<b>Signalement au point focal régional</b> (survenue de 5 cas dans un délai de 4 jours)	OUI	OUI	OUI
Nb EHPAD max	140		

## TROD-Grippe

### Groupe 1

Mise à disposition gratuite de TROD-grippe (Influenzatop® Biosynex).

Composition des kits fournis:

- 5 TROD ( écouvillons + réactif)
- Mode d'emploi
- Plaquette prise en charge de la grippe en EMS
- Questionnaire
- Feuille de traçabilité


### Groupe 2

Pas d'utilisation de TROD

### Groupe 3

Tests choisis par l'EHPAD ou réalisés par un laboratoire de ville.

Vidéo du mode opératoire disponible sur : [https://www.youtube.com/watch?v=cFgsyNuP\\_mQ](https://www.youtube.com/watch?v=cFgsyNuP_mQ)



1 Insérer horizontalement l'écouvillon stérile environ 3 cm à l'intérieur de la cavité nasale en frottant la surface de la muqueuse.



2 Décharger l'écouvillon au fond du flacon de diluant. Effectuer une dizaine de rotations de l'écouvillon contre les parois du flacon.



3 Appuyer l'écouvillon sur la paroi du flacon pour extraire le plus de liquide possible. Jeter l'écouvillon et refermer le flacon.



4 Déposer 3 gouttes dans le puits S de la cassette du test.



5 Lire le résultat à 10 minutes. Ne pas lire après 15 minutes.

